

## **Oswalin® (PZN 10331695)**

Hydrolysiertes, kolloidales Siliziumdioxid 15% plus Magnesium C315

### **Packungsinhalt (1 VE):**

1 Flasche Oswalin® Siliziumdioxid 15%, 100 ml  
20 Beutel Mineraldrink Magnesium C 315, à 4 g

### **Zutaten Oswalin® Siliziumdioxid 15%:**

Wasser (84,7%), Siliziumdioxid (15%), Säureregulator Natriumhydroxid (0,3%)

### **Zutaten Mineraldrink Magnesium C 315 + Vitamin C:**

Magnesiumcitrat (50,7g/100g), Orangepulver (Maltodextrin, Citronensäure, Orangensaftkonzentrat) 20,5%, Säuerungsmittel (Citronensäure, Säureregulator), Vitamin C (2 g/100g), Farbstoff ( $\beta$ -Carotin), Aroma (Orange, Zitrone), Süßstoffe (Natriumcyclamat und Saccharin.Natrium)

### **Nährwertdeklaration für Nahrungsergänzungsmittel nach RICHTLINIE 2002/46/EG (2011)**

<b>Zusammensetzung</b>	<b>pro Tagesportion</b>	<b>%NRV*</b>
Magnesium	315 mg	84%
Vitamin C	80 mg	100%
Siliziumdioxid	450 mg (bei 75 kg Körpergewicht)	**

\* tägliche Referenzmenge laut VO(EU) 1169/2011

\*\* keine tägliche Referenzmenge vorhanden

### **Was ist Oswalin®?**

Oswalin® ist eine sinnvolle Ergänzung aber kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.

1 ml Oswalin® entspricht 150 mg kolloidalgelöstem Siliziumdioxid.

Hochdosiertes Magnesiumcitrat kombiniert mit Vitamin C, Magnesium C 315, unterstützt die Aufnahme von kolloidalgelöstem Siliziumdioxid und trägt zur Aufrechterhaltung normaler gesunder Knochen, Zähne und Muskelfunktion bei. Magnesium hat eine Funktion bei der Zellteilung.

### **Verzehrempfehlung Oswalin®**

1x täglich, vor dem Frühstück, nüchtern 1 ml Oswalin® pro 25 kg Körpergewicht verdünnt in einem Glas Wasser (150 ml) einnehmen. Empfehlenswert ist die Einnahme mindestens 30 Minuten vor dem Frühstück. Alle 2 Tage den Inhalt eines Beutels Magnesium C 315, mittags oder abends, in einem Glas Wasser (150 ml) gut verrühren und trinken. **Oswalin® und Magnesium C 315 nicht zusammen einnehmen.**

Es wird empfohlen vor der Einnahme von Magnesium C 315 mindestens 3 Stunden zur letzten Einnahme von Oswalin® abzuwarten.

Die angegebenen, empfohlenen Verzehrsmengen dürfen nicht überschritten werden.

**Wie ist Osvalin® aufzubewahren?**

Aufbewahrung: Raumtemperatur, 5 – 35° C, nicht im Kühlschrank aufbewahren.

Nach Anbruch innerhalb von 30 Tagen aufbrauchen.

Vor Sonnenlicht schützen.

Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Weitere Informationen**

Herstellerinformation:

Alnapharm AG & Co. KG

Poppenbütteler Bogen 68

22399 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 600 88 31-0

Fax: +49 (0)40 600 88 31-50

osvalin@alnapharm.com

www.alnapharm.com

Made in Germany